



Ordre : Pezizales

Famille : Pezizaceae

Smardaea planchonis (Dunal ex Boudier) Korf & W.-Y. Zhuang

Synonymes : *Plicaria planchonis*, *Greletia planchonis*, *Marcelleina atroviolacea*

Au sol, souvent sous *Cupressus*. Apothécies 1-2(5) cm, sessiles, étalées, bleu-violet sombre. Spores 9-12 μ m, rondes, lisses, avec quelques gouttelettes à l'intérieur.

Ascomycète bien caractérisé, à comparer néanmoins avec :

- *S. ovalispora* : teintes similaires, surtout lié aux pins et cèdres, seule autre espèce du genre à posséder des spores lisses, mais ovales (12-14 x 8-9 μ m) ;
- d'autres *Smardaea* à teintes plus ou moins violettes mais à spores ornées ;
- *Marcelleina persoonii* : dans les milieux humides, spores 9-12 μ m verruqueuses ;
- *Marcelleina benkertii* : sur sol nu ou moussu, apothécies 5-9 mm, spores 9-12 μ m lisses avec une guttule.

Espèce fréquente entre novembre et février dans son écologie de prédilection, aussi bien sur le littoral qu'à l'intérieur des terres, sous cyprès ou thuyas. A noter ci-dessus à droite une récolte dont l'apothécie la plus grande atteignait 55 mm.

Biblio : Discomycetes de France Grelet p. 99 - Ascomiceti d'Italia G. Medardi - Funghi di ambienti dunali G. Monti, M. Marchetti, L. Gorreri, P. Franchi.



