



Ordre : *Leotiales*

Famille : *Helotiaceae*

Ombrophila fagiseda Baral - **sp. nov, nom. prov.** (espèce nouvelle, nom provisoire).

Souvent sur faînes de hêtre. Apothécie 1-6 mm, ombiliquée, hyménium rose violacé, face externe concolore. Stipe court assez épais. Chair gélatineuse. Spores 12-14 x 4-5 μm avec une petite guttule à chaque pôle et quelques gouttelettes. Asques amyloïdes. Paraphyses avec une longue guttule réfringente au sommet se transformant en petites guttules avec l'âge.

A comparer avec quelques espèces aux teintes plus ou moins rose lilacin saumoné :

- *O. janthina* : sur bois ou cônes d'épicéas, spores 5-6,5 x 2,5-3 μm ;
- *O. violacea* : sur bois, spores 7,5-10 x 4-5 μm ;
- *O. lilacina* : sur bois, spores 9-12 x 4-5,5 μm ;
- *O. pileata* : sur plantes herbacées, spores 16-30 x 3-4,5 μm .

La récolte présentée ici a été réalisée en septembre 2008, sur faîne de hêtre en forêt de Secondigny. La plus grande apothécie mesurait 2 mm. La microscopie nous a montré des asques de 62-87 x 9 μm et des spores de 12-14 x 4-5 μm .

Biblio : DVD H.-O. Baral