



Ordre : *Amanitales*

Famille : *Amanitaceae*

## *Amanita caesarea* (Scop. : Fr.) Pers.

Noms français : Amanite des Césars, oronge

Sous feuillus. D'abord « en forme d'œuf », entièrement couvert d'un voile épais blanc. Chapeau orangé vif à rouge orangé. Lames jaune doré. Stipe jaune clair ou doré muni à la base d'une volve en sac très épaisse. Spores 10-12 x 7-8 µm.

A noter qu'il est fréquent que cette amanite soit envahie d'une pellicule rose, il s'agit d'un champignon parasite nommé *Mycogone rosea* (cf. cette fiche). Elle peut être confondue avec *A. muscaria* (amanite tue-mouches) et ses différentes variétés dont le chapeau peut souvent être orangé et dépourvu de verrues, notamment en raison de la pluie ou du passage des limaces. Attention également au caractère accidentel des lames qui peuvent être jaunes chez toutes les amanites tue-mouches (cf. fiche *A. muscaria* var. *aureola*).

Cette belle amanite est très typique. Elle ne fait pas son apparition tous les ans, mais les années où les conditions sont favorables, il est possible de la rencontrer sur de très nombreux secteurs, et selon nos observations surtout entre les mois de juillet et d'octobre.

Biblio : littérature courante.



