



Ordre : *Amanitales*

Famille : *Amanitaceae*

## *Amanita coryli* Neville & Poumarat

Sous noisetier (*Corylus avellana*). Silhouette fragile, grêle et élancée. Chapeau généralement nu, beige grisâtre, avec un net mamelon souvent plus foncé, marge longuement cannelée. Stipe mince et long (2 à 3 fois le diamètre du chapeau), blanchâtre puis gris brunâtre. Volve membraneuse blanche ou maculée d'ochracé. Spores globuleuses à subglobuleuses, (8,5)9,5-13(14)  $\mu\text{m}$ . Dans notre région, à comparer notamment avec :

- *A. vaginata* : habitat sous chênes, châtaigniers et hêtres ; port plus trapu et chapeau plus nettement gris ;
- *A. betulae* : habitat sous bouleaux, chapeau dans les tons noisette (grisonnant avec l'âge).

La sous-section *Vaginatinae* (amanites sans anneau) comportant de nombreux taxons de création récente ayant tous été très longtemps confondus ou compris dans un sens très large, il ne nous est pas possible de donner la répartition de cette espèce dans notre région. Cette amanite n'est peut-être pas très rare, mais délicate à séparer d'*A. vaginata* ; il est à noter qu'un contrôle microscopique (dit KK+ ou KK-, que nous ne détaillerons pas ici) peut séparer ces deux espèces. Les récoltes présentées ici n'ont pas subi ce contrôle microscopique, elles ont été réalisées aux Essards, à Port d'Envaux et à La Gripperie.

Biblio : Fungi non delineati Pars LI-LII, P. Neville et S. Poumarat.

*Fiche réalisée en février 2017 par Patrice TANCHAUD*

