



Ordre : Pezizales

Famille : Ascobolaceae

## *Lasiobolus macrotrichus* Rea

Sur excréments d'animaux sauvages. Apothécies inférieures à 1 mm, jaunâtres ; marge pourvue de longs poils, très variables en taille, de 300 à 1000  $\mu\text{m}$ . Spores 17-23 x 8,5-12  $\mu\text{m}$  (selon les ouvrages), présentant généralement des bulles de de Bary.

Note récolte a été réalisée en février 2014, sur crotte de chevreuil à La Bouverie, commune de La Tremblade. Microscopie : poils atteignant 800-900  $\mu\text{m}$  ; asques 180-190 x 12,5-16  $\mu\text{m}$  ; spores 22-23,5 x 8-9  $\mu\text{m}$ . Nous n'avons pas observé de bulles de de Bary sur les spores éjectées, ce qui peut arriver semble-t-il ; en effet, le degré de maturité aurait une incidence sur cette observation, et elle se révélerait souvent plus nette sur des ascomes ayant séché.

Biblio : DM 117-118 p. 90 - Häffner Die Gattung Lasiobolus (1996) - Fungi fimicoli Italici, Doveri.

*Fiche réalisée en septembre 2025 par Patrice TANCHAUD*