



Ordre : Agaricales

Famille : Psathyrellaceae

Coprinellus xanthothrix (Romagn.) Vilgalys et coll.

Synonyme : *Coprinus xanthothrix*

Nom français : Coprin à flocons jaunes

Sur souches, branches et débris ligneux de feuillus. Chapeau jaune roussâtre à flocons pointus rouillé pâle. Stipe blanc. Spores 8-10 x 5-6 μm (non réniformes et ne dépassant pas 10 μm), elliptiques à ovoïdes avec un pg (pore germinatif) central.

A comparer avec les espèces de la même Section *Domestici* (cf. fiche *C. domesticus*), notamment *C. bipellis* qui présente un voile épais se rompant par plaques et des spores avec un pg excentré.

Espèce fréquente pouvant être observée à tout moment de l'année. Il est à noter que nous avons de nombreuses récoltes réalisées en milieu dunaire (cf. page 4), ainsi que sur places à feu, écologie signalée dans l'ouvrage « Funghi e cenosi di aree bruciate, G. Monti, M. Marchetti, L. Gorreri, P. Franchi » (cf. pages 3&4).

Biblio : littérature courante - Studies in Coprinus d'Uljé - Ehrhard Ludwig, Pilzkompendium Band 1 - DM n° 86 (juin 1992) et n° 95 (oct. 1994) tome 24 (clés du genre Coprinus par M. Citérin) - BK4 307 - Mille et un champignons P. Roux.





