



Ordre : *Agaricales*

Famille : *Psathyrellaceae*

## ***Coprinopsis erythrocephala*** (Lév.) Redhead et coll.

Synonyme : *Coprinus erythrocephalus*

Nom français : Coprin à tête rouge

Souvent grégaire, sur sol riche en débris de bois, de paille ou de déchets végétaux, parfois sur places à feu. Chapeau 10-20 mm, couvert d'un voile fibreux rouge orangé, brunissant avec l'âge. Lames noires à maturité. Stipe concolore au chapeau dans la moitié inférieure, pâle au sommet. Spores 8-13 x 5-8 µm avec un très net pore germinatif.

A comparer avec *Coprinellus pyrrhantes* qui possède un chapeau plus terne, un stipe blanc et une microscopie totalement différente.

Coprin typique avec ses magnifiques couleurs, il est très rare, nous n'en avons que deux observations automnales, toujours au sol parmi des débris de bois, dans les secteurs de Saintes et Port d'Envaux.

Biblio : littérature courante - Studies in Coprinus d'Ulje - Ehrhard Ludwig, Pilzkompendium Band 1 - DM n° 86 (juin 1992) et n° 95 (oct. 1994) tome 24 (clés du genre Coprinus par M. Citérin).





