



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Tricholomataceae*

Armillaria cepistipes f. pseudobulbosa Romagn. & Marxm.

Au sol à proximité de feuillus. Solitaire ou en petits groupes, mais pas en touffes. Chapeau brun, méchuleux surtout au centre. Lames blanches. Stipe crème beige à brun ochracé, base un peu en massue, jaune plus ou moins vif ; anneau blanc cotonneux et fragile. Spores 7-9 x 5-6 µm, boucles présentes aux cloisons des hyphes.

Avec son stipe plus ou moins bulbeux, ce taxon peut être confondu avec *Armillaria gallica*, mais ce dernier présente des squames réparties sur tout le chapeau, une tendance au jaunissement et un anneau frangé de jaune, d'où la nécessité de réaliser ces observations sur des sujets jeunes ayant conservé leurs caractères. *A. cepistipes* type, s'en distingue par son allure plus élancée et la base du stipe sans teintes jaunes.

Sur nos secteurs de prospection, cette espèce est visible chaque année, notamment à la période automnale, nous l'avons rencontrée en de nombreux endroits, en forêts et dans les parcs.

Biblio : littérature courante - Mille et un champignons P. Roux

Fiche réalisée en janvier 2015 par Patrice TANCHAUD