Ordre : *Entolomatales* Famille : *Entolomataceae*

Clitopilus cf. passeckerianus (Pilát)Sing.

Espèce décrite d'après récoltes sur meules de champignonnières, également signalé depuis dans la nature sur fumier de cheval, paille compostée et meule de foin. Chapeau latéral 0,8-4 cm. Lames blanches, légèrement rosâtres à maturité. Stipe subnul. Odeur et saveur farineuses. Spores 7-9 x 4-5 µm.

La récolte présentée ici a été réalisée en octobre 2012 sur la commune du Gua, sur vieille bouse de vache ; l'odeur et la saveur étaient subfarineuses, les spores mesuraient 7-8(8,5) x 3,5-4,5(5) µm. Les espèces proches telles que *C. hobsonii* (synonyme de *C. pleurotelloides*) et *C. pinsitus* sont signalées sur bois mais ne semblent guère avoir de différences microscopiques. Reste donc à savoir si, d'une part, notre récolte peut être rapprochée de ce taxon, et si d'autre part, il s'agit effectivement d'espèces différentes, mais nous nous avançons probablement beaucoup trop n'étant nullement informé ou expérimenté sur la question alors qu'aucune synonymie n'est avancée dans la littérature.

Biblio : Flore analytique des champignons supérieurs Kühner & Romagnesi p. 174 - Pilzkompendium band 1 - Miscellanea Mycologica n°50 (mars 1997)

Fiche réalisée en avril 2014 par Patrice TANCHAUD