



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

## *Cortinarius melanotus* Kalchbrenner

Nom français : Cortinaire à squames brunes

Sur sol calcaire, sous feuillus ou conifères, surtout sous sapins (*Abies*). Chapeau couvert de mèches brun-noir sur fond brun olive. Lames jaune olive à brun ochracé, arête plus claire. Stipe blanchâtre guirlandé de voile brun olive. Chair gris olive à blanc jaunâtre. Odeur de persil, saveur douce. Spores 6-8 x 5-6,5 µm, subglobuleuses. A comparer avec :

- *C. submelanotus* : très proche, voile jaune verdâtre peu visible sur le stipe, odeur mêlée de rave et de persil ;
- *C. venetus* : surtout sous conifères, parfois sous hêtres, chapeau fibrilleux et feutré mais non méchuleux, voile jaune olivâtre ténu, odeur de rave ;
- *C. olivaceofuscus* : surtout sous charmes et chênes, chapeau lisse à fibrilleux, odeur de rave, spores ellipsoïdes ;
- *C. cotoneus* : espèce plus massive à chapeau plus clair.

Sans être très fréquent, nous avons répertorié ce cortinaire à plusieurs reprises sur de nombreux secteurs de la région, en forêts de feuillus, généralement l'automne mais parfois l'été.

Biblio : littérature courante - ADC Bidaud et al. - GEPR.

