



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

Russula lutensis Romagn. & Le Gal

Nom français : Russule de la boue, des borbiers

Sous feuillus, dans les milieux boueux, les fossés ou chemins humides. Chapeau rouge purpurin, rouge cuivré à rose-rouge. Lames blanches puis jaunes. Stipe blanc. Odeur faible à légèrement fruitée, saveur douce. Sporée 4b-4c. Gaïac assez vif sur stipe, fer faible. Spores 7-9,5 x 7-8 µm à verrues isolées ou subcrêtées. Avec une sporée autour de 4c (mais microscopie différente en cas de doute), à comparer par exemple avec :

- *R. pseudointegra* : douce à légèrement amère, gaïac nul ou presque ;
- *R. laeta* : saveur un peu astringente dans les lames, fer rose-orangé pâle, présence de dermatocystides incrustées ;
- *R. melitodes* (parfois avec des teintes inhabituellement rouges) : sous peupliers, chair sous-cuticulaire rose, fer rosâtre, spores à verrues isolées ;
- *R. rubroalba* : chapeau décolorant en crème, gaïac faible, spores presque totalement réticulées.

Dans la région, cette russule semble visible presque tous les ans. L'écologie est une bonne piste de terrain pour la nommer, mais dans le cas où elle n'est pas connue, c'est un ensemble de caractères qui doivent être associés afin de la comparer aux nombreuses russules rouges qui existent.

Biblio : littérature courante - Russules Romagnesi - Russula Sarnari - GEPR.

Fiche réalisée en août 2022 par Patrice TANCHAUD





