



Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

Cortinarius mystagogi Carteret & Reumaux

Sous feuillus. Chapeau sec, micacé, fibrilleux, gris bleuâtre pâle à gris violacé, plus crème ochracé vers le centre. Lames lilacines puis beige ochracé pour finir rouillées. Stipe blanc grisâtre bleuté, plus violacé au sommet. Chair blanchâtre à lilacine. Odeur herbacée terreuse, saveur douce. KOH brun pâle sur cuticule et chair. Spores 8-9 x 5-5,5 µm.

Ce binôme appartient à la Section *Sericeocybe*, Série *Alboviolaceus*, où quelques espèces sont à comparer, voir par exemple la fiche de *C. alboviolaceus*.

Malgré quelques divergences entre nos deux récoltes, faute de mieux pour le moment, nous les rapprochons du binôme ici décrit, avec les réverses qui s'imposent...

Ci-dessus à gauche : novembre 2011, sous feuillus dans les bois de Port d'Envaux.

Ci-dessus à droite : novembre 2010, sous feuillus dans les bois de Meursac ; malgré des similitudes avec *C. alboviolaceus*, nous pensons pouvoir le distinguer au vu des teintes lilacines intenses, un chapeau prenant des tons grisâtre livide et un stipe peu voilé.

Biblio : ADC Bidaud et al.