



Ordre : *Helotiales*

Famille : *Hyaloscyphaceae*

Ciliolarina cf. neglecta Huhtinen

Sur conifères. Apothécies 0,4 mm maximum, stipitées, hyménium blanc blanchâtre, jaunissant ou parfois rougissant, marge pourvue de poils clairsemés et discrets. Spores 4,2-5,5(6,8) x 1,2-1,8(2,2) μm , souvent avec une guttule à chaque extrémité. Asques 28-35 μm , octosporiques, J+ et IKI+. Paraphyses à vacuoles réfringentes homogènes. Poils finement granuleux et courts.

Avec une écologie similaire, à comparer avec *C. laetifica*, espèce proche qui se distingue par des asques J- et des spores légèrement supérieures (5-6,5 x 1,8-2,4 μm). Il est à noter que ce groupe reste néanmoins à débrouiller.

Récolte réalisée en janvier 2017, sur pin mort dans un lieu brûlé à Montendre. Les spores observées mesuraient 4-6 x 1,5-2,2 μm . Nous remercions MM H.-O. Baral et M. Hairaud de nous avoir mis sur la piste de ce genre (proche des *Cistella*) peu connu.

Biblio : Huhtinen 1993, bibliotheca mycologica, 150 : 93-103 - DVD H.-O. Baral.

Fiche réalisée en juin 2025 par Patrice TANCHAUD

