



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

Russula pseudoaeruginea (Romagn.) Kuyper & Vuure

Sous feuillus, surtout sous chênes sur sol argilo-calcaire. Chapeau vert olivâtre, centre crème. Cuticule séparable jusqu'à la moitié. Lames blanches, puis crème ochracé. Stipe blanc. Odeur faible, chair douce, lames légèrement âcres. Gaïac nul à subnul sur stipe et lames. Sporée 2c-2d. Spores 6,5-8,5 x 5,5-6,5 µm, verruqueuses et subréticulées. Poils de la cuticule pointus et typiquement en tonnelets, présence de dermatocystides.

A noter l'existence de *R. pseudoaeruginea* f. *galochroa* qui distingue les récoltes à chapeau plus pâle, blanchâtre crème teinté de gris verdâtre, souvent taché de rouille.

Notre récolte a été réalisée en juin 2017 en forêt de La Braconne, l'ensemble des éléments macroscopiques et microscopiques étaient réunis pour envisager le taxon ici décrit. A nos yeux, cette espèce ne semble pas fréquente dans la région.

Biblio : littérature courante - Russules Romagnesi - Russula Sarnari.

Fiche réalisée en juillet 2017 par Patrice TANCHAUD