



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Hygrophoraceae*

## *Hygrocybe cinereifolia* Courtecuisse & Priou

Nom français : Hygrophore à lames cendrées

Dans les milieux herbeux. Chapeau 2-4 cm, conique, orangé rougeâtre à jaune orangé, assez rapidement grisonnant noircissant. Lames grises dès le départ. Stipe jaune noircissant dans la moitié inférieure. Chair noircissante. Spores (8)9,5-12(15) x 5-7,5(9)  $\mu\text{m}$ . Baside bi- ou tétrasporiques. Présence possible de cheilocystides clavées.

A comparer avec :

- *H. tristis* (taxon restant d'ailleurs à cerner, espèce à part, variété ou synonyme de *H. conica* ?) : lames jaunes ou pâles ne grisonnant que tardivement, stipe entièrement noircissant, arête des lames sans cheilocystides.

Cet hygrophore semble visible tous les automnes, à l'intérieur des terres et dans les pelouses sablonneuses du littoral, nous tenterons d'être plus attentif à l'avenir sur sa présence dans notre dition. Cette récolte a été réalisée en compagnie de notre ami François Valade en milieux herbeux dans le secteur de Roussines. Nous remercions vivement le projet Funif-Col du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris qui a procédé au séquençage d'un exemplaire.

Biblio : DM tome XXII, fasc. 86 - littérature courante - Boertmann éd. 2010.