



Ordre : Tricholomatales

Famille : Tricholomataceae

## ***Clitocybe ditopa* (Fr.) Gillet**

Nom français : Clitocybe à odeur de farine rance

En milieu humide, plutôt sous conifères (épicéas). Chapeau 15-40 mm, hygrophane, gris-brun, couvert d'une pruine grise. Lames subdécurrentes, grisâtres. Stipe concolore au chapeau. Odeur et saveur fortes de farine. Spores 3-4 x 2-3  $\mu\text{m}$ , subglobuleuses.

Avec la même odeur, à comparer avec :

- *C. augeana* : véritable sosie à écologie similaire, spores 4-5,5 x 3-4  $\mu\text{m}$  ;
- *C. vibecina* (syn. *C. langei*) : chapeau non pruineux, spores 4,5-7 x 3-4,5  $\mu\text{m}$ .

Attention également à *Tephrocybe striaepilea* et à *T. substriaepilea* (parfois placés dans le genre *Lyophyllum*) qui possèdent des spores de dimensions légèrement supérieures.

Espèce probablement peu fréquente dans la région, notre récolte a été réalisée en octobre 2017, sous conifères, en milieu humide en forêt de Brigueuil.

Biblio : littérature courante - Funga Nordica.