



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Tricholomataceae*

Tricholoma stans (Fr.) Sacc.

Sous conifères et surtout sous pins. Chapeau brun rougeâtre à brun grisâtre, visqueux, marge cannelée. Lames blanchâtre crème. Stipe blanchâtre, brunissant à la manipulation, sans zone blanche contrastée au sommet. Odeur et saveur farineuses. Spores 4-5 x 3-4 µm.

Egalement sous pins, avec une chair blanche, à comparer surtout avec :

- *T. pessundatum* (qui serait une rare espèce) : chapeau avec des guttules sombres vers la marge qui est non cannelée, stipe uniformément coloré de blanc roussâtre sans zone blanche ;
- *T. albobrunneum* : chapeau moins vivement coloré couvert de fibrilles innées, zone plus ou moins blanche au sommet du stipe.

Nous sommes-là en présence d'un tricholome très commun sur le littoral, mais choisir la bonne épithète pour le présenter n'est pas chose aisée avec le trio cité supra ; nous optons pour le binôme ici décrit, moins connu que *T. pessundatum* qui a souvent été utilisé pour baptiser de telles récoltes. Nous ne manquerons pas de revenir sur cette fiche dès l'instant où nous penserons pouvoir y apporter quelques éclaircissements car, à notre avis, la situation actuelle reste à débrouiller...

Biblio : The Genus *Tricholoma*, Christensen & Heilmann-Clausen - GEPR.