



Ordre : Gomphales

Famille : Ramariaceae

Ramaria eumorpha var. helodes Christan & Bauer

Synonyme : *R. helodes*

Surtout sous conifères. Fructification de petite taille, 2-8 cm, blanc-beige à jaune crème, ochracé orangé à maturité. Extrémités pointues, plus claires à subconcolores. Tronc simple ou cespiteux. Odeur parfois anisée ou miellée. KOH ocre rouge sur chair. Spores 5,8-8 x 3-4,2 μm à ornementation épineuse. Rhizomorphes avec cristaux en étoile, basides et hyphes bouclées. A comparer avec :

- *R. eumorpha* : spores plus grandes (6-10 x 3-4,8 μm), cristaux absents ;
- *R. decurrens* : fructification plus dense, spores plus petites (4,4-7,6 x 2,6-4,4 μm) ;
- *R. myceliosa* : spores plus petites (3,5-5,9 x 2,2-3,7 μm).

A ce jour nous avons deux récoltes qui se rapportent à ce taxon :

- à gauche novembre 2009, sous cyprès sur l'île de Ré ;
- à droite : décembre 2017, sous épicéas dans les bois de Pessines.

Biblio : Die Gattung Ramaria in Deutschland Josef Christan p. 270 - Cahiers FMBDS n° 6 (2017) Gannaz & Raillère-Burat.

