



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Dermolomataceae*

Hodophilus foetens (W. Phillips) Birkebak & Adamčík

En forêt ou lisière, à terre. Chapeau 5-30 mm, brun grisâtre puis brun-noir à maturité ou en séchant, surtout vers la marge. Lames beiges puis gris-brun, décourbées, assez espacées et nombreuses (18-30 lames). Stipe plus ou moins brun-gris, parfois avec quelques granulations concolores. Forte odeur, dite de naphthaline. Spores 5-6 x 4-4,5 µm. Caulocystides d'une largeur entre 6,5-11,5 µm. Epicutis hyméniforme.

Avec une odeur plus ou moins similaire, à comparer avec :

- *H. albofloccipes* : stipe jaune ponctué de blanc ;
- *H. tenuicystidiatus* : chapeau brun orangé non noircissant, nombre de lames identique, caulocystides 4-7 µm de large ;
- *H. pallidus* et *H. subfoetens* : lames nettement plus espacées, donc moins nombreuses, environ 10-20 lames seulement par chapeau.

Cette espèce est peu fréquente, nous avons néanmoins plusieurs récoltes réalisées entre les mois de septembre et de janvier, dans différents secteurs tels que Saintes, Port d'Envaux, La Chapelle des pots, St Savinien, Pons, en Charente, etc.

Biblio : littérature courante - DM HS n° 5 - Mycological Progress (2017) 16:47-62.

