



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

Russula stenotricha Romagnesi

Sous feuillus. Chapeau vert à gris-verdâtre plus ou moins décoloré en ochracé par le centre ou par plages. Lames crème ochracé à maturité. Stipe blanc, jaune roussâtre par la base. Odeur sans particularité, saveur douce à légèrement âcre dans les lames. Gaïac nul à faible. Sporée 2b-2c. Spores 6-8,5 x 5-7 µm, crêtées à subréticulées. A comparer surtout avec :

- *R. aeruginea* : sous bouleaux, réagit vivement au gaïac ;
- *R. parazurea* : sur sol siliceux, sporée 2a ;
- *R. atroglauc*a : sous bouleaux, spores à ornementation plus fine.

Voir également quelques espèces proches sur la fiche de *R. ochrospora*.

Espèce probablement peu fréquente, mais où une microscopie complète s'avère quasiment indispensable pour une détermination à peu près fiable dans cette Ss.section *Griseinae* où les espèces sont proches. Notre récolte a été réalisée en août 2013 dans les bois de Port d'Envaux, sous feuillus mêlés en l'absence totale de bouleaux.

Biblio : littérature courante - Russules Romagnesi - *Russula Sarnari*.