



Ordre : Russulales

Famille : Russulaceae

Russula rubroalba (Singer) Romagn.

Sous feuillus, surtout sur sol calcaire. Chapeau rouge pourpre à rouge vif, parfois décolorant par plages en rougeâtre cuivré à ocre jaunâtre. Cuticule peu séparable. Lames crème puis jaunes. Stipe blanc, se tachant de jaune-brun par la base. Chair ferme. Pas d'odeur particulière, saveur douce. Gaïac faible sur stipe et lames. Sporée 4d. Spores 6,5-8,5 x 6-7,5 µm à réseau presque complet. Seul un ensemble de caractères peut permettre d'aboutir à ce binôme, à comparer par exemple avec deux espèces à sporée identique mais qui possèdent des dermatocystides :

- *R. maculata* : chapeau taché de rouille, spores non réticulées avec quelques connexifs ;
- *R. lutensis* : réaction plus vive au gaïac, spores verruqueuses.

La récolte présentée a été réalisée en juin 2017 en forêt de La Braconne, sous majorité chênes, cette russule semble peu fréquente à nos yeux.

Biblio : littérature courante - Russules Romagnesi - Russula Sarnari - GEPR.

Fiche réalisée en juillet 2017 par Patrice TANCHAUD