



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

Russula recondita Melera & Ostellari

Sous chênes et pins. Chapeau 3,5-7 cm, longuement cannelé-strié, ochracé à brun grisâtre. Lames crème, parfois tachées de rouille. Stipe blanchâtre avec la base souvent tachée de rouge ou de brun rouille. Odeur plutôt désagréable, fruitée à caoutchouteuse. Saveur douce, ingrate après quelques secondes de mastication. Sporée 2c-2d. Gaïac vif sur stipe et lames. Spores 7-8,5 x 5,5-7 µm avec des verrues isolées ou brièvement connexées.

A comparer avec trois autres taxons à saveur douce :

- *R. praetervisa* : véritable sosie, spores avec des verrues reliées formant un réseau plus ou moins complet ;
- *R. hortensis* : sous chênes verts, chapeau plus sombre, odeur de poisson, spores réticulées ;
- *R. insignis* : présence d'un voile jaune orangé au bord du chapeau, mycélium jaune, KOH rouge orangé à la base du stipe.

Espèce décrite récemment (2016), récoltée sur le littoral et à l'intérieur des terres. Il était d'usage de baptiser de telles russules *R. praetervisa* (ou *R. pectinatoides*, synonyme ss. auct.), par conséquent de nouvelles observations seront nécessaires afin d'avoir une idée de sa répartition dans notre région.

Biblio : Mycol Progress 2016, DOI 10.1007/s11557-016-1256-y - GEPR.