



*Ronce les bains, oct. 2013*



*Forêt de la Coubre, nov. 2013*

Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

## *Lactifluus brunneoviolascens* (Bon) Verbeken

Synonymes : *Lactarius brunneoviolascens*, *L. luteolus* ss. auct. (taxon dorénavant américain)

Nom français : *Lactaire salissant*

Souvent sous chênes, sur sol sablonneux du littoral, également à l'intérieur des terres. Chapeau feutré, blanchâtre puis ochracé à brunâtre sale. Lames blanchâtre crème, brunissant au froissement. Stipe blanc, brunissant. Odeur mêlée, fruitée et de crustacés. Lait assez abondant, blanc, séchant typiquement en brun noirâtre sur les lames. Spores 7,5-9 x 6-6,5 µm.

A noter que ce lactaire était connu sous le nom de *L. luteolus*, taxon américain dorénavant réservé à ce continent.

Ce lactaire est très particulier avec son chapeau velouté et surtout son brunissement. Nous l'avons récolté en 2013 alors qu'il semblait n'avoir jamais été observé par le passé dans nos départements, et nous l'avons rencontré depuis dans différents secteurs, tels que La Tremblade, St Palais sur Mer, Meschers, etc. et plus occasionnellement à l'intérieur des terres...

Biblio : littérature courante - GEPR.





*Pessines, oct. 2013*



*Ronce les bains, oct. 2013*



*Commune de Combiers ou Charras (16), août 2014*



*Juicq, août 2014*