



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius rubricosissimus *asp. tuberosus* Chevassut et R. Henry

Sous conifères. Chapeau 30-55 mm, largement mamelonné, hygrophane, brun rougeâtre à brun châtain, séchant en cocarde à partir du centre et prenant un aspect marbré, gris-rose jusqu'à beige par bandes radiales vers l'extérieur. Lames brun rougeâtre puis brun rouillé, arête denticulée blanche. Stipe violacé au sommet, guirlandé en-dessous de voile blanc sur fond ochracé jaunâtre, souvent coudé ou atténué vers la base. Chair gris-mauve au sommet du stipe, crème blanchâtre ailleurs. Odeur et saveur sans particularité. Spores 7-9,5 x 4,5-5,5 µm, moyennement verruqueuses.

Nous avons observé ces cortinaires à plusieurs reprises en novembre 2018, en assez grand nombre dans un sous-bois mêlé de *Cupressus* et chênes à La Chapelle des Pots. Ces récoltes correspondent en tous points à l'aspect *tuberosus* de *C. rubricosissimus*, taxon de la Section *Rubricosi* décrit dans la pars 23 de l'ADC, l'espèce type décrite sous feuillus s'en éloigne notamment par les couleurs du chapeau et du stipe et surtout l'absence de pigments violets.

Biblio : ADC Bidaud et al.

