



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

***Cortinarius rubricosissimus asp. tuberosus*** Chevassut et R. Henry

Sous conifères. Chapeau 30-55 mm, largement mamelonné, hygrophane, brun-rougeâtre à brun châtain, séchant en cocarde à partir du centre et prenant un aspect marbré, gris-rose jusqu'à beige par bandes radiales vers l'extérieur. Lames brun rougeâtre puis brun rouillé, arête denticulée blanche. Stipe violacé au sommet, guirlandé en-dessous de voile blanc sur fond ochracé jaunâtre, souvent coudé ou atténué vers la base. Chair gris mauve au sommet du stipe, crème blanchâtre ailleurs. Odeur et saveur sans particularité. Spores 7-9,5 x 4,5-5,5 µm, moyennement verruqueuses.

Nous avons observé ces cortinaires à plusieurs reprises en novembre 2018, en assez grand nombre dans un sous-bois mêlé de *Cupressus* et chênes à La Chapelle des Pots. Ces récoltes correspondent en tous points à l'aspect *tuberosus* de *C. rubricosissimus*, taxon de la Section *Rubricosi* décrit dans la pars 23 de l'ADC, l'espèce type décrite sous feuillus s'en éloigne notamment par les couleurs du chapeau et du stipe et surtout l'absence de pigments violets.

Biblio : ADC Bidaud et al.

