



Ordre : *Boletales*

Famille : *Boletaceae*

Lanmaoa fragrans (Vittadini) Vizzini et coll.

Synonyme : *Boletus fragrans*

Nom français : Bolet odorant

Surtout sous chênes sur terrain peu calcaire. Chapeau velouté, brun à brun rougeâtre. Pores jaunes puis verdâtres avec l'âge, bleuissants. Stipe jaune, base brun rougeâtre et pointue. Chair jaune pâle, bleuissante. Odeur fruitée puis rappelant la chicorée. Spores 11-13 x 3,5-4,5 µm.

A comparer avec :

- *Alessioporus ichnusanus* : méridional, sous chênes, souvent en touffe, présence d'un net réseau en relief dans la partie supérieure du stipe avec un bourrelet cicatriciel en-dessous (bord du chapeau collé sur le stipe au tout début de sa croissance) ;
- *Baorangia emileorum* : (syn. *Boletus aemilii*, syn. probable *B. spretus*) : chapeau rouge-rose à rouge vineux, pores décurrents.

Nous avons rencontré ce bolet en différents points de Charente-Maritime (littoral compris), Charente et Deux-Sèvres, il reste néanmoins peu fréquent et surtout visible l'été et en début d'automne.

Biblio : littérature courante.







