



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

Russula nuragica Sarnari

Sous chênes sur sol calcaire. Chapeau bariolé aux teintes variables, mauve bleuté plus ou moins taché de rose (pour son aspect le plus typique), mais aussi avec des tons ocre grisâtre ou jaunâtres, parfois même totalement jaune. Cuticule séparable jusqu'à mi-chapeau. Lames blanchâtres puis jaunes à maturité. Stipe blanc, grisonnant. Saveur presque douce, à peine âcre. Odeur faiblement fruitée. Réaction positive au gaïac sur stipe et lames, mais pas très rapide. Fer rose orangé sur stipe. Sporée 4b-4c. Spores 8-10 x 6,5-8 µm presque totalement réticulées. Cuticule constituée de fins poils cloisonnés et de dermatocystides non cloisonnées, non incrustées, réagissant à la sulfovanilline.

Les caractères de l'exemplaire présenté conduisent à la Sous-section *Integriforminae* où se situe ce taxon : sporée 4c, stipe légèrement grisonnant, âcreté peu perceptible, microscopie. Cette récolte a été réalisée en juin 2013, sous chênes verts dans les bois de Sablonceaux.

Biblio : littérature courante - *Russula* Sarnari.