



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

Lactifluus oedematopus (Scop.) Kuntze

Synonymes : *Lactarius oedematopus*, *L. volemus* var. *oedematopus*

En forêt. Chapeau velouté mat, souvent un peu craquelé, brun jaunâtre, brun-roux à brun vineux avec le centre plus sombre. Lames crème ochracé se tachant de brun au toucher. Stipe concolore au chapeau. Lait blanc, très abondant, doux. Odeur faible de topinambour ou de crustacés. Réaction verte au sulfate de Fer. Spores 8-9 µm. Poils du pileipellis ne dépassant pas 60 µm.

A comparer avec :

- *L. volemus* : véritable sosie, poils du pileipellis 85-125 µm ;
- *L. rugatus* : sur sol sablonneux, chapeau souvent craquelé, réagit en orange au sulfate de Fer.

Seul le recours à la microscopie (poils du pileipellis 32-60 µm) permet une détermination fiable de ce lactaire. Nos récoltes ont été réalisées en Charente-Maritime et Charente. De nouvelles observations seront indispensables pour connaître sa répartition, en comparaison de *L. volemus*, nom bien plus ancien et connu, mais dont nous pouvons douter maintenant de l'existence dans la région au vu de son nouveau concept.

Biblio : Fungal Biology 120, 2016.

