



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Lyophyllaceae*

Calocybe buxea var. hypoxantha (Joss. & Rioussset) Consiglio & Vizzini

Synonyme : *Lyophyllum hypoxanthum*

Nom français : Lyophylle à lames jaunes

Sous cyprès sur le littoral. Chapeau feutré de blanc plus ou moins mauve vers la marge, parfois totalement mauve pâle (cf. page 2). Lames jaune vif. Stipe blanchâtre. Chair immuable et odeur nulle. Spores 4,5-5 x 3,5-4 µm.

C. buxea se distinguerait uniquement par son odeur farineuse et la chair noircissant à la coupe, les dernières analyses moléculaires ne séparent pas la variété de l'espèce type, d'où la nouvelle combinaison adoptée ici conformément à RdM cité ci-dessous.

Cette belle et rare espèce est à dénicher dans la litière des vieux cyprès. Selon les années, nous pouvons l'observer sur une période assez longue allant de novembre à mai, sur de nombreuses stations de l'ensemble de l'île de Ré. Nous l'avons également rencontrée sur les îles d'Aix et d'Oléron.

Il est à noter (cf. dernière page) que des exemplaires un peu âgés finissent par noircir, tout comme le fait la chair avec le temps sur des exemplaires coupés.

Biblio : littérature courante - RdM, 2014.







