



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Lyophyllaceae*

Lyophyllum semitale (Fr. : Fr.) Kühner

Plutôt sous conifères sur sol sablonneux. Chapeau 2-7 cm, hygrophane, brun noirâtre à gris-brun. Lames blanchâtres puis gris-brun, noircissantes (parfois un peu bleuissantes) au frottement. Stipe blanc grisâtre, fibrilleux. Odeur et saveur farineuses. Spores 6-9,5 x 4-5,5 µm, elliptiques.

A comparer avec quelques espèces plus ou moins sosies aux lames également noircissantes, sans jaunissement :

- *L. deliberatum* : spores losangiques ;
- *L. paelochroum* : spores globuleuses ;
- *L. maas geesterani* : petites spores elliptiques ;
- *L. transforme* (syn. *L. trigonosporum*) : spores triangulaires.

Avec des spores elliptiques, mais des lames jaunissantes, voir *L. aemiliae*.

Notre observation de cette espèce, semble-t-il peu fréquente, a été réalisée en décembre 2019 sur l'île de Ré. La microscopie, indispensable chez ces lyophylles « salissants », nous a montré des spores mesurant 7-8,5 x 4-5 µm.

Biblio : BK3 268 - GEPR.