



Ordre : Pezizales

Famille : Pyronemataceae

Aurantiolachnea solsequia (Quél.) Van Vooren

Synonymes : *Humaria solsequia*, *Lachnea hybrida*, *Humaria aurantia*

Sur bois, souvent de peuplier, ou sur sciure. Apothécies 5-25 mm, cupuliformes. Hyménium orange à jaune orangé, marge et face externe garnies de poils bruns. Spores 15-16,5 x 8-9 μm , biguttulées, lisses ou finement ponctuée (ponctuation difficile à observer même à grossissement x 1000 dans le bleu coton). Poils bruns, cloisonnés, pouvant atteindre 2 mm sur la marge.

Deux espèces possèdent un air de ressemblance, il s'agit de :

- *Chaetothiersia cupressicola* : sur débris de *Cupressus*, plus jaune, spores biguttulées, lisses, de taille supérieure (18-19 x 10,5-11,5 μm).
- *C. eguttulata* : sur débris d'*Abies*, jaune orangé, spores non guttulées.

Magnifique ascomycète, bien caractérisé et rarement signalé, nous l'avons déniché en octobre 2019 sur un tronc de peuplier pourrissant dans le secteur de Fontcouverte. Les spores contrôlées mesuraient 15,5-16,5 x 8-9 μm .

Biblio : Boudier planche 356 - Bull. FMBDS n° 197, p. 43-49 (2010) - Ascomycete.org, 13 (1) : 1-4 (2021).



