



## ***Cortinarius dryobalaustinus*** Kuyper

Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Synonyme : *C. imperatorum*

Sous feuillus (*Fagacées*), surtout sous chênes. Chapeau 3-6,5 cm, hygrophane, beige ochracé entièrement givré de blanc au départ, puis brun orangé assez vif pour finir brun roussâtre sale. Lames beiges puis rouille. Stipe blanc, fibrilleux, sur fond ocre orangé. Chair marbrée d'ochracé, odeur et saveur sans particularité. KOH vert olive sombre sur cuticule. Spores 7,5-9,5 x 4,5-5,5 µm.

Les exemplaires de la page 2 proviennent de La Chapelle des Pots, donc à l'intérieur des terres, nous les avons observés en novembre 2018 sous chênes, avec l'impossibilité à l'époque d'approcher une identification. Tous les autres proviennent d'une seule et même station à Ronce les Bains, sous chênes verts, où les exemplaires poussaient en troupes durant l'automne 2024. Sur le terrain, à nouveau en présence de ces cortinaires à allure de « jamais vu », nous avons préféré multiplier les photographies. Les recherches dans la littérature à notre disposition s'avérant toujours vaines, nous avons procédé à l'étude ADN d'un échantillon, avec un résultat qui fut sans appel et un peu surprenant, en effet ce taxon venait d'être publié très récemment, à deux reprises, en 2024 et 2025, avec le nom prioritaire bien sûr utilisé ici. A noter la très grande similitude de nos basidiomes avec ceux de la récolte de Corse (bull. FAMM, photographie D. Borgarino). Nous remercions vivement le projet Funif-Col du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris qui a procédé au séquençage, ainsi que les amis mycologues qui nous ont adressé la littérature nécessaire.

Biblio : Flora Agaricina Neerlandica n° 8 (2024) - Bull. FAMM n° 68, 2025, p. 40-68 (+ correctif Bull. FAMM n° 69, 2026).

*Fiche réalisée en juillet 2026 par Patrice TANCHAUD*





