



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Lyophyllaceae*

Lyophyllum deliberatum (Britzelm.) Kreisel

Synonyme : *Lyophyllum infumatum*

En forêt. Chapeau brun ochracé à brun grisâtre, parfois pâle. Lames blanchâtres à gris bleuté, bleuissant au frottement puis noircissant. Stipe blanchâtre à gris brunâtre. Odeur et saveur nulles ou farineuses. Spores 8,5-11,5 x 5-6,5 µm, typiquement losangiques.

A comparer avec d'autres espèces noircissantes, telles que :

- *L. macrosporum* : spores similaires, port nettement tricholomoïde, chapeau ocre jaunâtre à brunâtre pâle, plutôt montagnard ;
- *L. semitale* : spores elliptiques 7-9,5 x 4,5-5,5 µm, odeur et saveur farineuses ;
- *L. maas geesterani* : spores elliptiques 4,7-5,7(7) x 2,6-3,3(3,8) µm ;
- *L. transforme* (égal *L. trigonosporum*) : spores triangulaires.

Cette espèce n'est pas rare dans notre région, elle est visible chaque automne, parfois encore tardivement l'hiver, nous la rencontrons fréquemment, aussi bien sur le littoral qu'à l'intérieur des terres.

Biblio : DM HS n° 5 - Pilzkompendium Band 1 Erhard Ludwig.

Fiche réalisée en juin 2015 par Patrice TANCHAUD



