



Ordre : Entolomatales

Famille : Entolomataceae

## *Entoloma fernandae* (Romagnesi) Noordeloos

Dans les prairies, les landes, les forêts de conifères, surtout en milieu acide. Chapeau variable, conique à campanulé, parfois papillé ou avec une dépression centrale, un peu hygrophane, gris-brun sombre voire rougeâtre, fibrilleux à subtomenteux, marge striée. Lames blanches teintées de grisâtre brunâtre, roses à maturité. Stipe subconcolore au chapeau ou légèrement plus pâle, lisse. Odeur et saveur farineuses. Spores 7,5-9 x 5,5-7 µm. Cystides et boucles absentes. Pigment très incrustant dans la cuticule.

A comparer par exemple avec *E. argenteostriatum* qui ne se distingue guère que par son stipe fortement strié et fibrilleux.

La variabilité de ce taxon peut dérouter tant les huit planches de l'ouvrage de E. Ludwig montrent des exemplaires très dissemblables. Notre récolte a été réalisée en juin 2018 sur la commune de Montendre, donc tout à fait dans son écologie de prédilection.

Biblio : Entoloma M.E. Noordeloos - Pilzk. 2 E. Ludwig.

*Fiche réalisée en septembre 2018 par Patrice TANCHAUD*