



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Inocybaceae*

Inocybe ovalispora Kauffman

Synonyme possible ? : *I. albomarginata*

Différent de : *I. ovalispora* ss. Kühner & Romagnesi (cf. fiche *I. tjallingiorum*)

Sous feuillus. Chapeau vergeté de brun châtain sur fond ochacé. Lames beige ochracé pâle, puis brun jaunâtre. Stipe ocre rosé, parfois blanc en bas, nettement bulbeux. Odeur caoutchoutée à pélargoniee. Spores 7-9 x 4,5-5,5 µm ovoïdes à sommet obtus. Cheilocystides métuloïdes fusiformes à clavées. Caulocystides métuloïdes sur toute la longueur du stipe.

Nous avons récolté cet unique exemplaire en octobre 2014, sous majorité chênes et charmes en forêt à Marennes. L'aspect très particulier du chapeau, rappelant celui d'*I. asterospora*, et le reste de la microscopie, avec notamment des spores typiquement conformes à la description ci-dessus, nous ont conduit au taxon présenté ici, placé dans la Section *Splendentes*, Ss.-section *Splendentinae*.

Biblio : DM n° 108 p. 57 - *Inocybe* Stangl - *Funga nordica*

Fiche réalisée en avril 2015 par Patrice TANCHAUD