



Ordre : *Pezizales*

Famille : *Morchellaceae*

Morchella importuna M. Kuo, O'Donnell & T.J. Volk

Synonymes : *M. costata*, *M. elata* ss. auct.

Parmi les écorces, sur les places à feu ou dans les vergers. Chapeau allongé, brun-noir à fauve olivâtre, avec des alvéoles souvent bien alignés (pouvant rappeler les mailles d'un pull-over) et le sommet des côtes généralement noircissant. Stipe blanchâtre crème. Spores 20-22 x 12-13 μ m.

A ce jour, nous connaissons cette morille dans les vergers de pommiers et poiriers, elle n'y est pas très fréquente, il faut parfois parcourir de nombreuses allées pour en rencontrer quelques-unes.

Biblio : Bull. SMF 126, 2010 - Mycologia 104(5): 1172, 2012.

Fiche réalisée en mars 2018 par Patrice TANCHAUD



Ci-contre : récolte réalisée en avril 2008 sous pommiers, pourrait faire penser à *M. eximia*, taxon méditerranéen ; mais nous sommes probablement en présence d'une forme de *M. importuna*, comme nous le confirme M. Philippe Clowez, spécialiste du genre.



Ci-contre : récolte réalisée en avril 2008 dans un milieu empierré après arrachage de frênes, rappelant fortement *M. vaporaria* var. *tholiformis*. Ce taxon n'est plus retenu dans les études récentes, il semble s'agir d'une forme luxuriante de *M. importuna*, comme nous l'indique M. Philippe Clowez, que nous remercions vivement.