



Ordre : *Agaricales*

Famille : *Psathyrellaceae*

## *Coprinellus curtus* (Kalchbrenner) Vilgalys & al.

Synonyme : *Coprinus curtus*

Coprophile, souvent sur crottin. Chapeau 2-8 mm, ovoïde, crème ochracé avec le centre brun roussâtre, couvert d'un voile granuleux brun orangé rougeâtre, puis étalé à maturité atteignant 7-15 mm, radialement cannelé et totalement gris jaunâtre avec le centre ocre. Lames assez espacées, noires à maturité. Stipe blanchâtre, pubescent. Spores 9,5-14 x 6,5-9 µm avec un pg (pore germinatif) excentré et prononcé. Basides tétrasporiques. Présence sur le chapeau de sétules à sommet capité mêlées à un voile constitué de sphérocytes.

Cette espèce, est très bien caractérisée par sa microscopie. Elle appartient à la Section *Setulosi* et Ss.-Section du même nom. Il est à noter que la non-observation des sphérocytes en raison du voile fugace sur le chapeau, pourrait conduire de façon erronée vers la Ss.-Section *Impatientes*.

Coprin rarement signalé, notre récolte a été réalisée sur crottin, en juillet 2021 sur la commune de Rioux.

Biblio : Studies in Coprinus d'Ulje - Ehrhard Ludwig, Pilzkompodium Band 2 - DM n° 86 (juin 1992) et n° 95 (oct. 1994) tome 24 (clés du genre Coprinus par M. Citérin).

