



Ordre : *Agaricales*

Famille : *Psathyrellaceae*

Coprinopsis lotinae (Picón) Picón

Synonyme : *Coprinus lotinae*

En forêt, au sol ou sur débris de bois. Chapeau 4-15 mm, ovoïde puis conique campanulé, souvent avec un mamelon proéminent, peu déliquescent, blanc, couvert de fibrilles concolores, grisonnant avec l'âge. Lames blanches puis gris noirâtre. Stipe concolore au chapeau. Spores 12-15 x 5-6,5 µm à pore germinatif central. Cheilocystides lagéniformes ventrues. Hyphes de la cuticule globuleuses, hyphes du voile plus ou moins allongées.

Par le passé, suite à l'article du DM 33 fasc. 132 de déc. 2004, de telles récoltes furent nommées *P. marcescibilis* var. *virginea*, mais en réalité les auteurs ont décrit *C. lotinae*. *P. marcescibilis* (d'ailleurs basculé dans le genre *Coprinopsis*) peut bien sûr se présenter sous une forme blanche et être nommé ainsi, mais son chapeau n'est pas mamelonné et il ne possède du voile qu'à la marge.

Cette petite espèce n'est pas rare dans notre région, nous l'observons souvent sous feuillus dans de nombreuses zones humides, mais parfois aussi sur bords de chemins forestiers.

Biblio : DM 32, fasc. n° 126 (2003 - Zizak 7: 45 (2011)).

Fiche réalisée en mars 2016 par Patrice TANCHAUD

