



Ordre : Agaricales

Famille : Psathyrellaceae

***Coprinopsis spelaiophila*** (Bas & Uljé) Redhead, Vilgalys & Moncalvo

Synonymes : *Coprinus spelaiophilus*, *C. mitraespora*, *C. extincorius* ss. auct.

Souvent dans les blessures d'arbres vivants. Chapeau 20-35 mm de large, blanchâtre avec des mèches blanches à gris brunâtre. Lames noires à maturité. Stipe blanc. Spores 8-11,5 x 5,5-8 µm, ovoïdes. Voile piléique formé d'hyphes allongées (Sous-Section *Lanatuli*).

A noter une certaine ressemblance (spores subglobuleuses) avec *C. gonophylla*, espèce de la Ss-Section *Alachuani* (hyphes piléiques avec excroissances) poussant dans les lieux brûlés.

Coprin peu fréquent, observé à quelques reprises en Charente-Maritime et Charente. Nous avons remarqué néanmoins que les spores observées étaient généralement inférieures à celles indiquées dans la littérature.

Page 2, deux photographies du haut : récolte d'un exemplaire sur un tronc d'arbre à 2 m de hauteur.

Page 2, en bas à gauche : récolte d'un exemplaire atypique avec spores ne dépassant pas 8 µm.

Biblio : Studies in Coprinus d'Uljé - E. Ludwig, Pilzk. Band 2 - DM n° 86 (juin 1992) et n° 95 (oct. 1994) tome 24 (clés du genre Coprinus par M. Citérin).

