



Ordre : Tricholomatales

Famille : Pleurotaceae

Hohenbuehelia angustata (Berk.) Sing.

Sur bois de feuillus. Chapeau spatuliforme, finement pubescent de blanchâtre grisâtre puis beige brunâtre avec l'âge. Lames blanches puis jaunâtres. Stipe court, cotonneux. Saveur légèrement amère, odeur farineuse. Spores 3,6-5,5 x 3,3-4,8 μm , typiquement petites pour le genre. Cheilocystides lagéniformes avec un col plus ou moins étranglé. Pleurocystides métuloïdes (avec cristaux) abondantes. *H. auriscalpium* est une espèce proche qui peut paraître bien délicate à séparer, ses spores sont moins globuleuses.

Notre récolte, constituée d'un seul exemplaire, a été réalisée en octobre 2010, au lieu-dit « Le Talut » commune de St Sornin, sur bois de feuillu, station où sont essentiellement présents des saules, peupliers trembles et noisetiers. Chapeau 25 mm, odeur et saveur farineuses. Les spores mesuraient (4)5-5,5 x (3,5)4-4,5 μm .

Biblio : Bull. FMBDS n° 144 (1997) - Ehrard Ludwig, Pilzkompodium Band 1

Fiche réalisée en avril 2015 par Patrice TANCHAUD