



Ronce les bains, oct. 2013



Forêt de la Coubre, nov. 2013

Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

Lactifluus brunneoviolascens (Bon) Verbeken

Synonyme : *Lactarius brunneoviolascens*

Nom français : *Lactaire salissant*

Souvent sous chênes, sur sol sablonneux du littoral, également à l'intérieur des terres. Chapeau feutré, blanchâtre puis ochracé à brunâtre sale. Lames blanchâtre crème, brunissant au froissement. Stipe blanc, brunissant. Odeur mêlée, fruitée et de crustacés. Lait assez abondant, blanc, séchant typiquement en brun noirâtre sur les lames. Spores 7,5-9 x 6-6,5 µm.

A noter que ce lactaire était connu sous le nom de *L. luteolus*, taxon américain dorénavant réservé à ce continent.

Ce lactaire est très particulier avec son chapeau velouté et surtout son brunissement. Nous l'avons récolté en 2013 alors qu'il semblait n'avoir jamais été observé par le passé dans nos départements, et nous l'avons rencontré depuis dans différents secteurs. De l'avis de notre collègue Jacques Guinberteau, qui le connaît bien dans plusieurs stations arrière-dunaires en Gironde : « *ce lactaire semble favorisé par le réchauffement climatique, et remonte le long de l'Atlantique avec les bouffées d'air chaud* ».

Biblio : littérature courante - GEPR.



Pessines, oct. 2013



Ronce les bains, oct. 2013



Commune de Combiers ou Charras (16), août 2014



Juicq, août 2014