



Ordre : Agaricales

Famille : Psathyrellaceae

Psathyrella olympiana Smith

Nom français : Psathyrelle de l'Olympe

Souvent au contact de bois. Chapeau hygrophane, brun rougeâtre sombre puis brun-beige, présence d'un fin voile fibrilleux sur jeunes exemplaires. Lames ochracées puis brun rougeâtre. Stipe blanc à beige pâle. Spores 7,5-11 x 4,5-6 µm, brun clair. Cheilocystides et pleurocystides ventruës, ornées de cristaux au sommet, à paroi épaisse sur toute la longueur.

A comparer avec deux espèces sans voile à spores légèrement inférieures :

- *Homophron cernuum* : spores 6-9 x 3,5-5 µm, sommet des pleurocystides obtus à paroi peu épaisse dans la partie supérieure et très discrète en bas ;
- *Homophron spadiceum* : pleurocystides à sommet pointu.

Psathyrelle peu fréquente, observée à quelques reprises du printemps à l'automne, par exemple à Reignac (en compagnie de notre ami Robert Lagarde), Bussac sur Charente, La Gripperie St Symphorien et Ste Gemme.

Biblio : BK4 341 - Francis Fouchier « Le Genre Psathyrella » FAMM 1995 (clés d'après Kits van Waveren) - E. Ludwig, Pilzkompodium Band 2.

