



Ordre : *Pezizales*

Famille : *Pyronemataceae*

## *Otidea bufonia* (Pers.) Boudier

Synonymes : *O. umbrina*, *O. grandis*, *O. cochleata* ss. auct.

Dans les bois de feuillus et de résineux. Hyménium jaune olivacé à ochracé purpurin. Face externe aux couleurs variables et changeantes, brun olivacé, brun rougeâtre à brun violacé, et plus ou moins plissée pouvant rappeler « une peau de crapaud ». Spores 12-14 x 5,5-6,5 µm. Présence d'exsudats bruns (cellules incrustées) dans l'excipulum.



A comparer avec les espèces du même genre, par exemple *O. mirabilis* dont la face externe est vivement colorée de violacé.

Nous rencontrons cette espèce tous les ans, tant sur le littoral qu'à l'intérieur des terres, entre les mois d'octobre et de décembre, avec une récolte à signaler également en avril. Ses teintes fort variables sont déroutantes et ont conduit par le passé à la création de plusieurs espèces qui s'avéraient difficiles à distinguer, aujourd'hui synonymisées.

Biblio : Nordic macromycètes vol. 1 - Guide Vigot p. 652 - Pézizales de Rhône-Alpes (FMBDS), 1<sup>ère</sup> partie.







**Excipulum (exsudats bruns)**

**Paraph.**

