



Ordre : Leotiales

Famille : Rutstroemiaceae

Rutstroemia alni Urs Raffler & Hans-Otto Baral

Sur aulne. Apothécie brune à brun olive, stipe noir à la base. Spores 18-25(28) x (7)8-9,5(11) µm, droites ; asques (220)230-250(260 x 14-17(19) µm, excipulum textura prismatica/intricata. A comparer avec :

- *R. firma* : sur *Quercus*, spores droites ou arquées (14)16-20(23) x 5,5-6,5(7) µm, asques (145)150-180(210) x 11,5-12,5 µm, excipulum textura prismatica/intricata ;
- *Ciboria bolaris* : sur *Carpinus*, plus orangé rouge, spores pouvant rappeler celles *R. alni*, mais excipulum textura globulosa.

Nous avons une récolte d'une vingtaine d'apothécies, réalisée sur branchettes d'aulne glutineux (*Alnus glutinosa*), en janvier 2010 à St Sauvant. Nous remercions M. Hans-Otto Baral qui nous a confirmé que nous étions en présence de *R. alni*, espèce qui n'aurait jamais été récoltée auparavant sur *A. glutinosa*, elle n'était connue qu'en altitude sur *A. viridis* et *A. incana*.

Biblio : DVD H.O. Baral - Bull. SMMA n° 28 (2010).

Fiche réalisée en avril 2017 par Patrice TANCHAUD