



Ordre : Pezizales

Famille : Pyronemataceae

Tarzetta cupularis (L. ex Fr.) Lamb. ss. Dennis

Sur terre nue en forêt, sur bords de chemins. Apothécies souvent de petite taille, graciles, en forme de coupe, ochracées, marge crénelée pouvant être recouverte dans la jeunesse d'un voile aranéeux blanchâtre (certains auteurs distinguent d'ailleurs la *var. velata*). Stipe généralement présent, bien individualisé et grêle. Spores biguttulées 18-22 x 12-15,5 µm (dimensions variables selon les ouvrages).

Les taxons de ce genre sont, pour de nombreux mycologues, un véritable casse-tête, et la dernière étude publiée en 2019 (cf. biblio ci-dessous) n'est pas faite pour arranger les choses. Citons par exemple : *T. catinus*, *T. spurcata*, *T. ochracea*, *T. velata*, *T. pusilla* (apothécies sessiles de 5 mm maximum), *T. gaillardiana*, *T. bronca* (spores subcylindriques) ; mais aussi des espèces nouvellement décrites : *T. gregaria*, *T. sepultarioides*, *T. alnicola*, *T. alpina*, *T. melitensis* et *T. quercus-ilicis*, TOUTES avec des spores plus ou moins similaires...

A noter également l'existence du genre *Arpinia*, dont les espèces sont fort ressemblantes et rares, qui se distingue par la base des asques pleurorhynque (avec crochet) ; par exemple *A. fusispora* qui possède des spores plus petites et plus fusiformes que chez les *Tarzetta*.

Les contradictions et les caractères croisés étant nombreux dans la littérature, nous suivons M. H.-O. Baral pour tenter de nommer nos récoltes, sans aucune certitude aujourd'hui...

Biblio : littérature courante - BK1 64 - Ascomiceti d'Italia G Medardi - DVD H.-O. Baral - Ascomycete.org, 11 (6) : 309-334 (2019).

