



Ordre : *Entolomatales*

Famille : *Entolomataceae*

Clitopilus cystidiatus Hauskn. & Noordel.

En forêt ou en milieu herbeux. Chapeau assez charnu, mat à feutré, gris à gris-brun. Lames grises ou brun rosâtre, presque sans tonalité rose. Stipe blanc. Chair ferme et non fragile. Spores 9,5-13,5 x 5-6,5 µm. Cuticule à pigment nettement incrustant. Cheilocystides cylindracées. Boucles absentes.

A comparer avec :

- *C. prunulus* : peu charnu et très cassant, chapeau blanc blanchâtre, lames rose saumon sans tonalité grise, pigment non incrustant dans la cuticule, cheilocystides filiformes (attention, le nom d'espèce « *cystidiatus* » a parfois laissé penser que *C. prunulus* en était dépourvu) ;
- *C. paxilloides* : sans cystides et avec boucles ;
- *C. amarus* : amer et spores nettement inférieures à 10 µm.

Nous pensons pouvoir présenter cette espèce à l'aide de notre récolte réalisée à Brigueuil, ces exemplaires étaient très charnus, à chair élastique ; la saveur n'était pas très farineuse et non amère.

Biblio : Österr. Z. Pilzk. 8 {1999) - Bull. FMBDS n° 193.