



Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

Cortinarius furfuraceus Rob. Henry ex Bidaud

Synonyme : *C. hinnuleus* var. *furfuraceus*

Cespiteux sous conifères. Chapeau conico-campanulé à mamelon aigu, hygrophane, brun rougeâtre puis ocre orangé pour finir ochracé beige, marge furfuracée à squamuleuse. Lames fauve ochracé. Stipe subconcolore au chapeau plus ou moins couvert d'un voile blanchâtre dans la jeunesse. Chair brunâtre. Aucune odeur particulière. KOH violacé noirâtre sur cuticule et chair. Spores $7,5-11 \times 5-6,5 \mu\text{m}$. A comparer avec *C. tortipes*, autre espèce cespiteuse de la Section *Hinnulei*, qui possède des spores plus subglobuleuses.

Notre récolte a été réalisée en juin 2013 dans le secteur de Ronce les Bains, en milieu mêlé de feuillus et de pins, les spores mesuraient $8-10 \times 5-6 \mu\text{m}$. Malgré les difficultés d'identification des taxons de ce groupe, nous pensons pouvoir approcher du binôme ici décrit...

Biblio : Flore analytique des champignons supérieurs, Kühner & Romagnesi - ADC Bidaud et al.

Fiche réalisée en juillet 2026 par Patrice TANCHAUD