



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius balteatocumatilis R.Henry ex Orton

Surtout sous chênes, sur sol calcaire. Chapeau charnu, brun vineux à brun violacé, plus brun au centre. Lames blanchâtres à beige. Stipe très ferme, blanchâtre, un peu guirlandé de voile violacé. Chair blanchâtre, odeur terreuse et saveur douce. KOH ou NH₃ jaune orangé sur cuticule et chair. Spores 9,5-11 x 5-6 µm.

A comparer avec quelques espèces de la même Ss.-section *Balteati*, à lames grisâtre-blanc (avec des lames lilacines, voir la fiche de *C. largus*) :

- *C. balteatus* : binôme différemment interprété selon les auteurs, sous conifères et notamment épicéas pour les uns, sous feuillus pour d'autres et alors bien difficile à distinguer ;
- *C. balteatocumatis* var. *laetus* : tons mauves plus vifs que chez le type ;
- *C. daulnoyae* : chapeau violet mauve vif avec le centre décolorant en roux-orangé, chair blanchâtre violacé, odeur terreuse, KOH jaune sur chair ;
- *C. daulnoyae* var. *pseudodaulnoyae* : chapeau plus pâle et spores à peine plus petites que chez le type ;
- *C. cumatilis* : sous conifères, chapeau lisse et vivement coloré de bleu violacé ;

Espèce probablement peu fréquente dont nous n'avons que quelques observations dans la région, celle présentée ici a été réalisée en novembre 2012 dans les bois de Port d'Envaux.

Biblio : littérature courante - ADC Bidaud et al. - GEPR p. 758.

Fiche réalisée en août 2016 par Patrice TANCHAUD