



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius odoratus (Joguet ex Moser) Moser

Synonyme : *C. joguetii*

Nom français : Cortinaire odorant

Sous feuillus sur sol calcaire. Chapeau visqueux, vert-jaune à vert olivâtre puis brun olive. Lames jaune-vert, parfois avec tonalité violacée, puis olive rouillé. Stipe jaune-vert, éventuellement violacé au sommet. Chair blanchâtre à verdâtre pâle, parfois lilacine dans le haut du stipe. Odeur typique et puissante de fleurs d'oranger. KOH brun olive à brun pourpre sur cuticule, nul sur chair. Spores 9,5-11 x 5,5-6,5 µm. Avec des couleurs similaires, à comparer avec :

- *C. prasinus* : odeur subnulle, KOH rouge sang sur la cuticule ;
- *C. atrovirens* : odeur poivrée ou faible, KOH brun-rouge à noir purpurin sur cuticule ;
- *C. ionochlorus* : odeur faible, lames violettes.

Ce cortinaire n'est pas très fréquent, il peut néanmoins se rencontrer chaque automne, parfois dès le mois de septembre. A ce jour, nous n'avons eu aucun doute sur l'identification de nos récoltes tant l'odeur de fleurs d'oranger (rappelant celle d'*Hebeloma sacchariolens*) était puissante.

Biblio : littérature courante - ADC Bidaud et al. - GEPR.

Fiche réalisée en mai 2019 par Patrice TANCHAUD



