



Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

Cortinarius tomentosus R. Henry ex R. Henry

En forêt, plutôt sous feuillus. Chapeau 4-8 cm, légèrement visqueux au départ, rapidement sec, recouvert d'abondantes fibrilles rousses, velouté-tomenteux, jaunâtre ochracé, brun grisâtre à brun-jaune. Lames blanc lilacin puis ochracées. Stipe blanchâtre, parfois lilacin au sommet, taché de jaune ochracé dans la moitié inférieure, avec la base un peu clavée. Chair blanche puis crème, sans odeur particulière au départ, pouvant évoluer vers une odeur terreuse. Réaction jaune au KOH ou à l'ammoniaque. Spores 10-12,5 x 5,5-6,5 µm.

Ce cortinaire appartient à la Section *Patibiles* comprenant de nombreuses espèces souvent difficiles à distinguer, avec un chapeau également feutré, il est à comparer avec *C. crassus* et *C. pseudocrassus*, qui poussent surtout sous épicéas et possèdent des spores plus petites.

La récolte présentée a été réalisée en novembre 2017, sous charmes et chênes en forêt de Brigueuil, les spores contrôlées mesuraient 10-12 x 5,7-6,8 µm.

Biblio : Revista Catalana de Micologia, vol. 23: 1-24; 2001 - ADC Bidaud & al.

Fiche réalisée en juillet 2026 par Patrice TANCHAUD